

Signos de alerta

de las Inmunodeficiencias Primarias (IDP)

Las **IDP** generan en niños y adultos una mayor susceptibilidad a presentar infecciones que por lo general se reiteran y/o son de difícil curación. En Argentina se han registrado más de 1500 individuos que sufren alguna de las más de 200 diferentes IDP. Si Ud. o alguien que Ud. conoce **presentó 2 o más de los siguientes signos de alerta**, consulte con su médico para determinar si es posible que se trate de una Inmunodeficiencia Primaria.

SIGNO
01

Cuatro o más infecciones nuevas en el oído (otitis) en 1 año

SIGNO
02

Dos o más sinusitis graves en 1 año

SIGNO
03

Dos o más meses tomando antibióticos con poca mejoría

SIGNO
04

Dos o más infecciones pulmonares (neumonías) en 1 año o una por año consecutivo

SIGNO
05

Dificultades para crecer o aumentar de peso normalmente

SIGNO
06

Abscesos (colección de pus) recurrentes por debajo de la piel o en órganos

SIGNO
07

Infección por hongo (Candidiasis / Mughet) persistente en la boca o en la piel después del año de vida

SIGNO
08

Necesidad de antibióticos endovenosos para curar una infección

SIGNO
09

Una o más infecciones profundas o severas

SIGNO
10

Diarrea persistente o crónica con pérdida de peso de causa no conocida

SIGNO
11

Episodio o enfermedad autoinmune (ataque inmune a algo propio del cuerpo)

SIGNO
12

Ciertas infecciones virales a repetición (Herpes, Condilomas)

SIGNO
13

Algún familiar con Inmunodeficiencia Primaria

SIGNO
14

Enfermedades hematológicas de causa no clara (anemia, citopenias)